


和田泰純先生門人記錄



MED 503

和田泰純先生門人記錄

赤瘡ヲ病ミ瘡半ハ愈ントシ腫氣アル
者ニ大黃黃芩赤小豆湯ニ生梓白皮ヲ
桑白皮ニ代テ吳茱萸犀角麥芽ヲ加テ
用ラレシト有此病人腫氣内攻ニテハ
無キヨシ也

凡ソ今中風ハ皆是類中風ニシテ腹内
ニ積氣有ニ因テ左右氣不順ニ之偏枯
ノ症ヲ顯ス共ニ是癥瘕ノ心下ニ支テ
或ハ留飲ヲ成スモ皆積氣ノ或ハ石或
ハ左ヲ鑿ク故也當時病客腹裏ニ積氣
成ケル者ナシ滯ク診腹メ某ヲ子ノハ
シ世医或ハ牛足等ノ痛ミ或ハ癆等ノ
症ニ授ニ牛足ノミ氣ヲ付腹裡ヲ治メ
牛足ノ病ヲ治スルトヲ不知故ニ所方

老

元順經ノ制ヲ用テ懷裡ノ箭積ヲ不散
病ノ本因ヲ察セサル故ニ
凡手足不仁ニタル病ニ大柴胡ニ耳中
加テ治セラレシト有後抑肝散ニ加芍
藥轉ラレ
凡腫病ノ腫引タル後ハ肌肉指另ニ羸
瘦ニタルカヨシ
一者人疾喘氣急積氣有リ烟隆安是ヲ
診メ曰是老體ノ勞役之ト詔メ益氣湯
ニ朝鮮蓂三分加入テ用之服後疾喘益
々盛ニナル先生診之曰是肝之此人壯
年ヨリ一家ヲ起セ三人ニテ箭積有テ
留飲ヲ止ニテ集ル症之ト寛中湯吳茱
萸ヲ加テ令服之後頓ニ喑ニ後下利ノ
症ニナル是前制ニテ疾喘ヲ治シタル

氏再び感寒ニテ下利ノ症トナル莫武
 湯本方ニテ与之下利止テ四逆散ニ著
 類生芋ヲ加テ与之
 一男子左股ノ辺ニ塊アリ福井五助之
 ヲ診メ曰腸癰之下割ヲ与テ服後塊吻
 心下不密ノ辺ハ立突入先生診之曰是
 瘀血ノ腸癰宜左股ノ辺ニアラニマ腸
 癰ハ外ニ非サル者ニテ独リ脘ノ右ノ
 第ニノミアリ茲氏今擘割ヲ与テ不當
 之難治ノ症ニ病家陷テ乞力故ニ先ッ
 所入香砂六君子湯ニ厚ト加倍与之
 一男子寒ヲ犯メ夜歩ス偶感冒シ氣短
 手足微冷ノ氣味アリ一医診ミテ曰是
 レ中寒也ト四逆湯之類ヲ与テ服後弥
 ヲ短氣欬嗽面色赤ニ先生診之越鵬湯

加木苓方ヲ与テ頓ニ愈

病者ヲ知ラズ何ニモセテ浮下ノ不止
症アリ小羊夏加茯苓加薯蓣方ヲ与テ
下浮止リシコト有リ

一婦人咳嗽痰壅面色赤氣短ニ飲食共
ニ嘔吐ニ茅水ニ同吐ニ尽ス盧芳氏見
ハ妊娠共見ユル中西主馬診之曰黃連
湯ノ症ニト本方ヲ与ルコト數十日次第
ニ羸瘦ニ嘔吐ニテ茅湯不入先生診之
曰コト妊娠ニ三味ノ頓火方ヲ小劑ニシ
与テ頓ニ茅水収リサレ氏數日ノ間嘔
吐ニ食物ニ不快ニハニ休疲レ羸瘦甚
ニ漸ニニ諸症愈テ安産スト腹診ニ甚
摸抹アリ容易ニ辨ニ難処アリ
一婦人又以前ノ症ノ如シ嘔吐茅水入

ラス諸医勞症或ハ妊娠ト種トニ設ニ
方劑ヲ与レト不愈先生診之曰妊娠ト
虚勞ト今論スルニ不及先ツ嘔吐ヲ治
也スニハ不可有小劑ニメ理氣湯ヲ与
ラ子ノ嘔吐頓ニ止タリト云ニ先ケ様
ノ症嘔吐ヲ治シ某水食物収ルニ非ニ
ハ症ヲ辨スル暇ニアラニ乎
一痲客アリ口中ヨリ咽喉中ハカケ乾
燥ニテ難受スル由察ル所以ヲ先生ニ
問フ先生曰是心ツカヒスル故也保シ
心ツカヒ一ト通ニ求スセキヲテ探
ム故ニ肝火ノ上衝スルニ

時疫後大邪去テノ痲客ハ生駒元珉ナ
ト教誨メ夫君子陽ヲ子ノ先生此痲ヲ
診ニ視テ調胃養氣湯ヲ与テ治セラル

診

一男子歳十四五疳積ノ症四肢倦怠息氣
力懶惰ノ症扱ニテ始終鬱結ノ症ニ先
生診之曰四逆散ニ養生芩ヲ加ヘテ与
ヘラルトアリ
一男子歳四十許兩牛肩ヨリ酸痛ニ耳
鳴ル或ハ腎虛扱ト疑フ先生診之理氣
湯本方ヲ与フ症皆愈腹膨ヲ委曲ニテ
大ハ三角ヲ通シム
一病夫年五十許惡寒尅焚周身痛足跖
取頭眩或ハ胸中迫痛ハ症先生診之曰
濕毒也ト散毒散加石芋大黃方ヲ与ヘ
煎法袋煎ニテ煎三寸又三ム此症客前
劑ヲ服スルヲ數日而メ毒氣浮テ痛處
ナリサヲ何方モリヨクナル時三方ヲ
作テ与之一味配劑ニ大黃通中當散方

茅茨空瓦活丹中尊藥以上八味ナリ但
此時茅籠ニ尊藥無リカハ葦蕪ニ代テ
以上八味ナリ此方ニ葦蕪二十目
一點二八ヲ入テ水一斗五合ヲ七合ニ
煎五アル器物ハ大キナル土瓶之最
良無ニテ煎服ノ時茶碗ニテ降ヲ去テ
服セシム

一男子ト氣ニ短ク氣力盛ニ言語モ王
三年六十歳先生診之曰死期也間無キ
昔ヲ病家ヘ示ス此病者ノ処ハ眼精ニ
有リ鼻目ノ如ク赤メスワツテ居ル是
難治ノ症ナル故ニ辞ニ去ルト云々
先生曰凡病者眼精スハル者ハ難治ノ
症也並ニ大病人ハ神闕ノ脉ヲ可診ト
診法秘決集ニ云通りニ同シキ一二个

サレ 眞月ハ動カスヲ云赤カラス氏ス

先生曰急病緩病氏ニ病床ノ間ハ診脈

ニ入ル時先ツ病客ノ間ヲ隔テハ生メ

病人ノ影ヲ見ルハ三是秘法也如何成

力土杯ニテモ死病ナラハトコマラ形

咎ミソフラミク少サク見ニル者也能

ク察メ見ルハ三慎テアワテニ病床ニ

直ニ近ク寄テ不可診急病ホ病家アワ

テハ医者ヲ兎角ニ早ク診脈ヲ乞テ病

床ハ近ク寄ル者也必ス率爾ニ病床

不可寄間ヲ隔テ生ニテ能病客ヲ兼知

ニテ夫ヨリ診脈スヘシ

五年先生曰病人ヲ但テ客子見ルニ

是トヲナシ

又曰夜中ホニテモ暴病卒倒具外急症

病客ハ病家大キニ驚キアワテ、
急ニ招キ、アワテル者也。其時ニ送者
驚キ走テ病家ハ不可行心ス。病家ノ急
ニ乞ニ任テ、アワテ、不可行先ツ接テ
可見。左様ナル卒病ニ奔走メ行キ、常ノ
如歩ミテ行トテ、夫裡ノ寸隙ヲ以テ生
死ノ分ヲ争フ。様ナ病家ハ岐黃扁鵲カ
診ミテモ、豈能治ニヤ。故ニ送タル者急
病ニ向テモ如此ニ心得テ能氣ヲ丹田
ニ鎮メテ後ニ緩々ト病家ハ赴キ、其上
ニテ診スハミ
又曰病ヲ診ス凡ハ病家ニテ密子ヲ外
人ニ聞クニ早ク心中ニ所方メ是レ何
方ノ之ク症也ト思者、是レ具害有ル
変ニ診脉診腹ミテ方ヲ接ニ症ヲ弁ス

ル。勿論之。不焚ハ最初ノ心ニ浮フ処
附方ニ眩惑セラレテ高病ノ出者ニ
凡諸病氏ニ凡甲ヲ見ルハシ先沃アル
者ハ吉。脫厥ノ者ニ誤テ擊割下利ヲ与
ト忽ニ凡甲色沃ヲ失フ者也。

凡諸病氏ニ神劍ノ脉ヲ見ルハシ実症
指ヲ強ク按テ見ハ脉ヲハツカス底ニ
三ツト少クメ忒スル者也。攻下割ヲ与
ヌ此脉ニテ可考此脉宜キハ大抵ノ下
割ヲ与テモ格別ノ一無三虚人ハフハ
リトミテ浮実人ト相及ス。神劍ノ脉水
分ノ動ニテ寸口ノ脉皆診ニ様付三
ノ指ノ腹ニテ診ニ水分ノ動モ指ヲ以
診子ハナラヌ。

凡諸病ニ舌ニルク厚クナルアリ又見

薄ク成者モアリ皆惡候ト心得ヘシ
一女歳十五六、鬱滯疑水不調小腹二聚
リ有り血塊ト云釋ノ症ニテハ無シ去
レ氏病進メハ血塊ニモナル症ニ此婦
方 萊水ノ性味ヲ乞フ故ニ附子ス理氣陽
加紫胡方ヲ与ヘ別ニ氏佐有り瀉瘀
一小児年五六、歳性ヲ揉ミ氣ヲイラツ
症アリ先生診之テ抑肝散加芍薬ノ方
ヲ与エラレ旦ツニ歳許ノ小童ヲモ仰
卧シメ診腹ニ診脈ニモ三指以診ハル
一男子壯年ナリ疫後二三年毎症ナリ
健忘ス遠行スレハ倦怠ノ氣味アリ其
外別変ナシ濕毒ヲ最前ニ病ミタル人
又先生診之テ理氣陽平方ヲ与フ曰ク
如此ノ症ハ先ツ眼ノ方ヨリ仕カケテ

見ルカ吉ニ故ニ理氣湯ヲ与テ具薑リ
ヲ見ル也

妊痼ニハ家方ノ蓄瘀湯ヲ与フコト有
ルソ心下ニ瘀血ノヘツタリト疑ルコ
ト有リ如何ニシテモトケヌ者之死症ニ
後ニ血ヲ吐死スル者ナリ
凡疫癘ニ升陽散火湯之症ニ是久浮下
スルアリマハリ散火湯ニテ浮止ム者
有リ心得ヘシ又ケ様ノ症ニ初ヨリ附
利ニテ之カ子ハ成ヌ症アリ

應
痼ニ初ヨリミテ始終舌胎ノ白ノミテ
黒胎ニ成ヌ之大ケシキ者之黒胎ニモ
種ミアリ一處ニ云カタシ

如何ナル病人ナルヲ知ラズ升陽散火
湯金ニ両ヲ入レサセテ煎服セラレ門

人沙瘋ノ説ヲ問ノ先生答曰凡當時ノ
医多ク沙瘋ヲ説ク癰レ氏莫ノ沙瘋ハ
希ナル者ニ類瘋ハ多クアルヘシ世医
脚氣ノ症ニ沙瘋ナリト云者アリ誤也
是迄多ク病人ヲ診スルニ沙瘋ノ如キ
者數年ノ間一人ナラテ見ス只一人ノ
症ハ腹脹面部周身ニ赤キ縞糸ヲ乱
ニタル如シ三稜針ヲ以テ一々ニ之ヲ
撃ツ午ニ隨テ黒血ヲ流ス流スレハ赤
キ縞糸ノ如キ物須臾ニノ消清ス附方
ハ防風散沙散ヲ与

防風 荆芥 石羔_トホノ割ニ癰レ氏
平愈セスミテ然ニ飯泉入此症ハ先沙
瘋氏スヘキ者ニ癰モ田朝ニハ稀ナル
症ニ此症昇竟癰血ノ毒ノ夏ト見エ
ナリ

眠病如何ナル病ヲ不知洗方一カヲ作
テ

与ナル紅花黄連耳中石差以止虫味之

先生曰黄連水道ヲ通スルノ能アリ金

匱ニ防己黄芩湯ノ方アリ皮水ヲ散シ

皮表ヲ温メ皮膚不順ノ氣ヲ利ス

又曰附子ト烏頭トノ使ヒ様アリ烏頭

凝結ヲ解ニ宜シ

一医狗犬ニカニレニ病人ヲ治ス前所

敗毒散加拍山色子方ヲ与ルテ数十日

破傷ノ口ハ生薑或ハ大蒜ヲ片テ其上

ヨリ灸治ス先生ニ聞之曰可之

破傷ノ口ノメクリハ灸治スルノ之

真中ノ瘡口ニテハナシ

一医ノ見識曰凡今之病人氣滯ヲ兼サ

ルハナシ故ニ耳中太寒ハ氣滯ノ症ニ

緩ナリトシテ去テ不用ト先生聞之曰
今之病人氣滯ヲ兼ナルハ痰リ去ルニ
耳中大寒ヲ一鑿ニ去ルハ不心得ナリ
夫氣滯ニ耳中大寒ヲ用テ緩テ順利ス
ルノ症アリ考ヘシ

一男子歳中十年酒客ニシテ心下ニ水
氣ヲ留メ喘息氣アラシ先生診之曰
喘回君子陽加犀角吳茱萸方ヲ与ヘ之
ニ三日ニシテ頓ニ喘息去シ勢スルニ
是レ心下ニ余程凝リタル毒アリシ故
犀角ヲ用ラル、ト見ヘタリ始先生ノ
診セラル時其症ヲ旁觀スルニ戸黃杏
仁耳中石羔湯越時加水湯小青龍湯等
ノ症力又後世家ニハ蘊子降氣湯ノ類
ヲ与ル様ナ症ニ見セザル処ニ先生

ハ石ノ附方ニ榜ニ後世家ニテハ犀角
ヲ使リテ血症ニテ無レハ使リテ何レ
犀角地黄湯ノ矩矱ヲ不離就此犀角ノ
使ハル處ヲ見テ感歎ニ堪タリ

按ニ此病喘モ退テ快腹セシカト前
ノ如ク喘四君子湯矣茱萸犀角ヲ加
与ラル後ニ前方依テ生芩吳犀加用
一歲婦歲四十年是迄ノ病因ヲ得ト不
知荒増容子ヲ聞ニ往采^{松年}麻瘡有テ瘡已
ニ魚ヲ眠瘡ナレ附方敗毒散ニ加石羔
方ヲ与ラル此婦人矢疳ヲ乞フ先生曰
矢疳ハ此節毒氣ヲ動ルニ惡ト云々
濕毒壅^二集^一リ^二亂^一スル症ニ敗毒散
加石羔大黃方ヲ与ラル
傷寒論仲景方中ニ用エル所ノ括篋矣

ハ先生曰枯萼仁ヲ用ルカ者三ト又曰
枯萼仁ハ痼疾ヲ開クニ宜シ
又曰凡毒ノ胸先ニ潤クニ無クニ痼ルハ難
治ス

生節制ヲ服スルハ蘿蔔子ヲカヲ忌ム
但ニ蘿蔔ハ舊年ノ分不苦ニ蓋ハ新年
モ不忌ニ

一病人凡邪有行ニ症葛根湯加雲朮方
ヲ与ヘラレ

一医見識曰傷寒論中痼病今小児ノ驚
風是也故小児驚風ニ葛根湯用ルト先
生談話セラレ

先生家方ニ敗毒散ニ大ニ雲朮ト菊朮
トヲ加テ除濕凡父ト名付ク但ニ先生
家ニ用ル処ノ敗毒散ハ羌活柴胡ノミ

ニテ独活前胡加茺朮三藥入ヘシ

酒客ニテ吐血ノ症ニ黃連解毒湯ニ合

生芩四物湯方ヲ与ヘルニ三日吐血不

止ニ黃湯加芒莖方ニ轉セラル

寒氣ニテ腰痠屈伸ニ難シ也先生ノ

附方ニ和散之

凡脉ノ子ハル様ナル氣味ハ濕毒之

脉診ノ法先生曰診脉スルハ臂ヲ張り

尺沢ノ層ニ指ノ腹ノ當ル様ニ診スヘ

ニ指ノ腹ニテ診ノ一也

心下ニ水氣ヲ見ルハ水分ノ動ヲ指ニ

テ診ニ指ヲアクル時ノ模様ニモ氣ヲ

所ヘシ

凡腰下ノ氣ヲ診ニ指ヲ用テ腰下ヲ推

ニ指ヲアクル時ニ病人ノ呼吸ト腰下

勢に引合メ見ル呼吸ニツレテソキ
ニアル者ハ驚難治ノ症ナリ氏死期尙
有ト心得ヘ三是レ並同又亮傳
氏脚氣ト勞瘵ト濕毒トハ脈上五六分
任脈ヲ隔テ各一寸許ノ間右左ノ内必
動アル者アリ勞瘵ハ動ハ虛ニメ數之
大抵脈ト心ス脚氣ノ動ハ強ノ氣味有
リ濕毒ノ動ハ定法ナ三脈症能ク考テ
察スヘ三且以濕毒ヲ病ミタル人ハ必
右心處左右ノ内ニ動氣アル者ニ能ク
心得ハ三是又並同ノ情ニ
先生曰予ハ此義ヲ不覺
凡瘡ノ色白ハ血濕ナリ瘡ノ色ヲ以テ
血症ヲ診ニ察スルナリ

一男子歳三十五形ヲ是肥満ニ兎角寢

申スルト盜汗出テ是夕息苦ク別症ナ
三此胃子初年ニハ肥満ナカリ三力三
十二三才ノ頃ヨリ肥満ニタリ先生診
之見曰是留飲之心下ノ飲物サハク力
者三術方大柴胡湯加耳中方ヲ与ル
一婦人歳五十一短血ハ己ニトクヨリ
終ス此一兩年帶下ノ症起ル其内背ヲ
帶下止ミテアリ突モ此間ハ掛テ又
帶下ス飲食ハ尙病ヨリ平生ヨリモ進
ム程好ミ此節ハ少々煙氣ヲ催ス先生
診之曰此症飲食ヲ過スト次方ニ煙氣
受スル之故食ヲ進ト雖モソコヲ引
力ハ月ニスヘシト術方ニ陳湯加黑炒
子等香附子方ヲ与フ梅ニ此病又診時
此中ヲ能ク診テ
一婦人歳五十一余年指癆シ足ノ指モ時

時痛ム等ノ症アリ先生諺之曰ク是夏
ニキイラテ氣ヲ勞ル故ニケ様ニ心ヲ
積氣ヲ作シ夫ヨリミテ四肢氣不順ニ
成故也氣世話ヲ止メ長ク腹ヲセサレ
不活ト抑肝散加芍朮方ヲ与ヘ芍朮耳
中ヲ大ニメタノ先生曰此婦ハ耳朮ヲ
与ル症ニ耳朮ハ口中ニテ飲唯ニ同テ
好ニ又人多シ賀シ氏是ハ口中ノ間迄
也腹中ニ入ルトハツクリト善ニ此症
耳朮ニテ緩ル症也ル故ニケ様ノ
症ニ耳朮ヲ嫌フ人ハ是レ口中迄ノ忌
ミ嫌止ルニ依テヤワリ耳朮ヲ与ヘ煎
湯ヲ一時ニ大飲サシメ賀ミテ趾ニ口
中ヲウカヘリミテ宜ト談アリ可心得
一病人腹裡積氣ニ因テ周身少ク痛ム

等ノ症アリ此症理宜湯下ヲ与テ毎
日晚餐ニ蕎麥ヲ一椀當ニ食復トサセ
ルナリ有リ按ニ腹裡積氣四散ハ不仁
スル等ニハ蕎麥ヲ時々食ニ代ルモ宜
三ト心得ヘシ
一男子歳三十頃ノ辺ニ二三ヶ月モノ
癰ニトメ痛ム初メ散莖ヲ點ニテ愈
後又癰ニトスル又散莖ヲ點ス一兩日
以後右手殊ノ外痛タヘ唯ニ須臾ニ
項ノ辺癰セニトスル物止ニ只右手頻
ニ掬即晚餐ノ辺痛ム又右足モ痛而
欬嗽連続ニテ或ハ時ニ是ハ吐水ニ
止ニ皮肉羸瘦ス先生診之曰是濕毒
瘰癧体実症ナレハ王三今是ノ虚症ニ
テケ標ノ濕毒アリ中々容易ノ症ナ
ス

其ノ腹ハ脊骨ハ引続キ水分ノ動愈強
ク心下是通迫ス先此症ハ一般心下ヲ
不同不可有附方寬中湯加藳朮方ヲ与
ラレ栲ニ後前方ニ遂毒散ヲ兼用セリ
先生曰前漏ノ症ハ後必腫氣成心者
一壯男子兎角一兩年腹アニハイ不恒
近來大便汚スルト先生訪之不換金正
氣散著不火ニメ加圭苓方ヲ与フ

凡陽寒時疫ニ真ノ結胸ノ症余リ見タ
ル下無シ且結胸ノ症誤リ下メサルト
云氏槩ニタル言ニ難病人結胸ハ是晚
症ニミテ下割許成ヌ之凡熱病雜病凡
ニ腹中ノ是疾シキハ惡候也トミタモ
惡シケレ氏其ニ忘メサハトミタリカ
宜キ也勞瘵其外雜病ニ至ル迄病ト眼

中ト相応ニタルカヨシ
時疫后イツ迄ニ舌上黒或ハ白ノアル
者アリ是皆内火ノ一ニシテ焚中ニ行
火ヲ動ニテ焚リ年々計ニ残リ有ル者
アリ肝ヲ順ス劑ヲ与ヘテ愈ル也
大病ニ跌陽ノ脉左右共ニ尋ニテ順ナ
ルハ惡候ニ

時疫脫症ニ益氣湯加香附子方ヲラレ

トアリ

老門冬湯加石菖蒲連方ヲ与テ后ニ六

居子湯加老門冬白朮阿膠生芩方ヲ与

ラルト有按ニ血症ノ病也ト見ユ

風症ニ荊防芎藭散加生支芎根方ヲ与

ルトアリ

一婦人三十歳許大柴胡加耳中ノ症

後從來痔疾^三肛門ノ血腫起リ痛ム
涼膈散去芒硝加荆防^二方ヲ与ヘ服ス
ルニ喘テ綠凡水ヲサヘ加服スヘシト
願風ニ敗毒散加石羔方ヲ与ヘ再造散
ヲ兼用スルヲアリ

先生曰眼病^八過テ宜シ艾葉ヲ焚湯
ニ投シ具艾葉ヲ眼胞ニアヲ過ト作^九流
車含膏^一入出ル病客ニ注^二眼注膏ニテ免

角乘軀スルト胸膈モタヘ不食スル^三痰
ルニ或人傳ニテ乘軀セニト思ヘハ具
前ニ硫黄ヲ燒キ具氣ヲカク必ス食ス
ルニト是ヲ試ニ果メ功アリト^四謬久先
生之ヲ聞テ曰是硫黄ニテ胸中ヲス力
スナリト

山照ノ^五方ニ脚氣腫滿ノ症ニ^六換杏湯

元來凡兼用快復又蓋藏實一名學實ト
云郁李仁ノ代リニ用ル是穩ニ水氣ヲ
取ル効アリ服スルト腹痛ノ氣味モ無
腸鳴ノミニ事ノ外穩ニ水ヲ下スニ
是小枌方秀ノ誠驗ニ山根モ今之ヲ用ル
東郭先生曰大病人ヲ診スル眼神ハ勿
論ニ具外臍梁ヲ見ルト第一ニ必大病
難治ノ症ハ年壽明堂ノ四アニハク有
是書ニハ前ニヨリ臍梁ヲ診スルト無
久ニ南延ノ教動スルヲ而已載タリ
梁氏予刀誠驗ニ多ク臍梁ノナリニテ
生死ヲ斷スルトアリ
先生曰此病人ハ動氣之ヲ診スルニ敬
スル氣味アリ故ニ生芻劑ニテ不収是
故將湯膏取ルニ此受未何ノヲナルヲ

先生曰吐噦ノ有病人ハ鳩尾ヲ強く診
スルト忽テ吐噦ヲナス變アリ

濕毒アル症ニテ勞症ノ氣味ニナリ歟

嗽アリ先生曰此症毒氣アレト体氣瘦

ニテ有故ニ体氣ヲ不養ハ不可有滋陰

至室陽ニ加阿膠黒糖ヲ等テ煎ニテ

先生曰腹脹ヲ色々瘡疔ニ下劑ヲナテ

不化ノ症或ハ旅行ホニテ順氣スルト

頃ニ愈ルアリ是皆心下ノ積氣ヨリ

来ル腹脹ナリ心得ヘシ

又曰飯胃湯ノ腹ハ胸ヲナシ並ニ腹皮ノ

引ハルニ様子有り能ク心得ヘシ

又先生病客ヲ診ニ症ニヨリ此人是唯

急也セキイラツヲ體ニ云テ病人感

心スルアリ是皆積氣ノ胸下ハ捧テ

指込夕如ナレ大柴胡加耳中抄ノ行リ
処ノ症之先生曰嘔諺ニテ人性ノ緩急
ヲ知レルニト又曰右ノ症ノ病客氣ヲ
緩メ不保養ハ牛足痺痺半身不隨ノ症
起ルト

敗毒散加石羔將淨方土灰壹一點二十

分宛毎日二點一七日都合十四點土^灰壹

白四十目ヲ病客ニ与ヘラレ煎法水ニ

升ヲ七合ニ煎^{但ニ是煎法一日}病客

曰ケ様ノ第水多量服スルニ難カルヘ

ニト云先生曰不芟服第スルト小硬快

通ニ隨分服ニ多ク至極心ヲ三ト但三

服第中魚物ナク精進サスルカ恒ニ

先生ノ病人ヲ諺スル最初ニ掌中牛背

凡中ヲ曉時等ヲ能ク一覽セラレ具上

診脈でラレ且診ニ喘テ毎ニ年数ヲ尋
ラル、按ニ右ノ時三刀紋具外色相
ノ法ヲ以テ見テ可有ナリ

東郭先生病客ノ坐セルヲ見テ腹ノ宜
成タルヲ病人ニ云ハレ三ナリ又立
坐先生觀相ノ節今一往括内ヨリ腹ナ
ノ惡キヲ云レ三ナリ按ニ是等医家
ノ行要ナルハシ

一婦二十歳年行爵ニテ殊ノ外物ニ忌
嫌ニ多ク奇麗ヲ好ム症所方理氣湯ニ
加薯芋方与ヘラル

一病人短氣喘ニ心氣急ニテ面ニ冷汗
出ル症ニ但ニ此病人先生ノ談話遂ニ
大劑ノ越時加木苓犀角吳茱萸方与ヘテ
短氣収リ冷汗止ミ小便通ニ後ニ腹脹

ノ症ヲアラハセシト

脚氣羸弱ナルニ紫桂母合方ヲ与ヘテ
後大定湯

先生曰石羔ハ大劑ニシテ与ルニ非ス
ニハ具効ナシ如何トナレハ石膏具性
強者之故ニ古方白虎湯竹葉石甲湯具
外石羔ノ入ル第何レ氏他第ハハ具種
格別ナリ第力手生用ルハ具分量何レ
ニモ皆大量之他送石羔劑ヲ与ルニ小
量ナリ故ニ具効ナキハ宜ハナル哉
風冷ニ侵サレ咽痛又咽腫蒸湯ノ不通
大ルアリ諸送仲景ノ苦酒湯杯ヲ与ル
然レ第湯モ不通飲食モ不通他送皆与
テ来又余此症ニ無ニ一方ヲ与ヘテ治
也ニアリ秘授ナ耳諸子ニ示ス也ト曰

馳風解毒湯消毒飲ニ加 在連ヲ主劑ト

ニテ大ニ加ハ煎テ后ニ冷サシメ而テ

令服ル一即日咽痛止飲食等通スル之

是秘授スル者ニト毎度此方ニテ功ヲ

得ルト云々又云惣テ咽病ニ用ル煎湯

ハ皆令服ニテ其功アリ其飲ヨキノミ

惡キニ此方ニ非服ス

一老方一両年以來惡空サミアリ兎角

右ノ腹内痛ハ先生診之曰此症食養生

第一之堅キ物食スルニ不宣糜粥ニ恒

ニク其余菜物皆ミコハキ物ノ類忌ミ

恒ミト附方耳中ニテ考陽ナリ

一男子歳二十九一兩年以來兎角鬚毛

処々ハケ眉毛鬚毛其外上額鬚毛ノ類

処々ハケル之他逆訪之皆ミハミキ血

アリ抄ト云ヘシ然ル云ヘハ癰血等抄
ト云見ニテ癰病抄ト云ナルヘシ癰氏
是ハ別之先近來此症多シ余毎々此症
ヲ治ス是皆心下ニ積氣アリ夫レ前々
見ル此症モ皆酒客ナリ畢竟思惟スル
ニ是皆肝積アル人ノ酒客嗜ム客ニア
ル之如何トナルハ積氣ニテ上都不順
ナルニ具トニ又酒ヲ嗜ム因ラ上都不
焚ヲ甚スク持ミテケ様ノ症ニナル是
予カ見論之近來皆ニ是アリ氣ヲ緩ミ
衰ク腹第ニ旦酒ヲ捨ヘミト癰ラ人重
テ又發毛生スルヲ疑ナシト附方大禁
胡加丹中方可ナリ又云肝積ノ人酒飲ス
ルト一時ハ積氣削キ快ミト云ヘトモ
醒テ后猶更積氣ツノルナリ

先生曰石菴ヲ子ル場ハ大劑ニメクツ
ト用ニ非ニ人具効ナシ謂ル一杯ノ水
以テ一車薪ノ火ヲ治スト欲ル拙策之
故ニ某劑ヲ用ル場ニ至テ諸病皆大劑
大量ヲ以テ之ク場又小劑ニミテ是
症ク子ルアリ謂ル鉄炮ヲ數十度放ス
ト云氏慢導ヲ以具鉄炮ヲ防ノ場アリ
病耶慢導ノ鉄丸ヲ受ル力如ク強ホト
不受之此処ニ至テ症微ノ劑ヲ以テ之
ニ非ニ人具効ナシ又大劑ヲ以スル人
弥ウケス吐水吐茅ニテ不効場アリ生
曰ク鉄丸ヲ慢導ニテ如受ハ皆心下ノ
積氣カ拒テケ様ニスルナリ
玆間モ疫癘ノ客アリ中西主專父子種
々ノ大劑擊劑ヲ以テ子ルト益却テ某
水モ不効病体益甚三先生診之小羊夏

加我冷湯加生芩方ヲ与テ茅水ヲ収リ
漸々ニ其病退キ其後少々腫氣アルニ
因テ理氣湯ニ加麥芽ノ方ヲ与テ水氣
ヲ通ニ段々ヨシト是等ハ右之云処ニ
是人心下貯積アリテ閉タル者成故ニ
如此ニテ治セシト又曰凡心下ニ貯積
アル者ハ多ク茅水ヲ拒テ不受時疫凡
諸病ニ至テモ皆此場ニ至テ是手段有
リ之患メ右ノ時疫ニ小半麥加我冷湯
加生芩方ヲ与ルアリ危殆是等処可考
先生曰常時流行スル疫ト脚氣ト兼々
ルアリ是等ハ先解痰ノ劑石羔ニ服ハ
両方ヲ不隔之外量ニモ諦スル脚氣危
病ニ大禁疫ノ如クアリ是ニ同ニ先禁
ノ処ハ疫ナリト雖是部ノ下又腫氣モ

アリ傍々沈香降氣又ハ豁痰陽^ハニテ
セラレ又処之今流行スル瘧ハ時疫ノ
如ニメ脚氣ヲ兼腫氣アルニ越婢加朮
湯吳茱萸角方又此症ニ疝積ノ心下
ニアル者モ有テケ様ノ症ナルモアリ
何レニモ右ノ越婢加朮ノ方ヲ以テ之
ク処ニ疝積アル者ハ此止ニテ升陽散
火湯ヲ以テ之ク場ニナル^ハアリ
又曰脚氣ニテ来ル病人ニ杖ニスカリ
漸々先生家ニ来ル者ト又達者ニア
ルキテ来ル脚氣病人ニ具杖ニスカリ
タルヲ請取テ療治シ具達者ナルヲ強
辞^ク辞メ療治セサリ^ハアリ具メ杖ニ
スカリシ人ハ亦復シ右ノ達者ナルハ
死セシトニ惣メ病人ヲ誘スルニケ様

ノ者之ヨク、心得ハ三
又曰脚氣腫ニアル人ハ顔部血色ニ更
澤意アル之ト

行當時病人時症ナキ者ナシ如何ト成ハ
今方ニ作世ニシテ泰乎己ニ百歳各自
ニ其驕ヲ成サ、ル者ナシ其逸樂ヤ一
年二年ヨリ過キ其人マ生簞薄ク己力
量ノ小ナリ以テ過方ノ生計ヲイトナシ
己力量ノサキヲ以大ナル望ヲナシ身
ニ余ルヲナル故ニ自由ニナラス歟カ
故ニ性急イラテセキ物ニテ皆是力為
ニ肝症トナル之誤ル未世逸樂ノ極ニ
至テハ如此ニ故ニ肝症ハ當時人ニ大
概ハサニザル者ナシ今ヨリニテ後猶
此症盛ハニ是肝積ノ病因之余カ考ル

処大禁固加可也孫ノ方具小平生用
処ノ時症之第割皆是ヨリニ考へ出
セニナリ又按ニ此五六十年以前ハ家
々ニ五仕ノ婢元獲ノ類ハ猶ノ販ヲ着
セ入僅ニ郷販ヲナセニ當時ハ猶ハ
勿論綿綢ニテ着用ニ具ト荷ノ婢獲ハ
綿販セニテ思フ心ニ善トモセ入却
テ又此上ニ羽ニ童具余種ノ販ヲ欲
セトスルニ至ル是ヲ以テ是ヲ考ル
ニ上一人ヨリ下万人ニ至ル皆此理
アリ故ニ當時疳症ハ皆此理ヨリ起ル
今石ニ云如婢獲ニ至テモ當時疳積
ル者ハ皆是之人ノ背日ノ一ヲ忘レテ
不足ノ心ヲイタカル者ナシ
先生曰凡諸病氏耳ヘ入りタル症ハ

三堆者之

五岳先生曰凡予ノ無名指工カム者ハ
足痛アルカ何ソ足ニ申分有人之

又曰年上壽上ノ辺滑艶アル者ハ三
許ノ内徒忘ヲ患ル者アリ滑艶ハ伽

羅ノ油ノ如キ色ニ堆ノ色ニ

五岳先生曰耳ハ腎ノ主ル処故ニ房勞
ノ人ハ腎虚アル故ニ耳色惡シ又坡
白人ノ類ハ耳ノ色皆惡キ者ニ

一病人大黃割ヲ服スル人大黃ノ味ヲ
飲ニ忘ム者アリ先生曰癸ヲハ冷服ス
ルニ宜シ元氣衰弱ノ人ニハ非ス冷服
人尤宜シ且第陽ハ溫服スル寸火ヲア
ツルニ隨テ第氣ノ薄クナル者之余常
大黃割ヲ服スル皆冷服スル也

先生曰水分ノ動強ク任脉ニアル者ハ
生节ノ之ク処ニ動ヲ静ルニ非ニハ諸
症共ニ不治ルアリ任脉水分ノ動久カ
フル時ハ生节ヲ以治ルニ

一症後病又ニ發症ニ諸選皆ニ診之小
柴胡ノ場合ニ如何トナレハ發強伏ニ
夜中ニ發ハケニク向ニ眩胸苦滿心下
痞硬等皆是小柴胡ノ之ク処ト中西主
事等柴胡湯ヲ以テ子ルト至具症益熾
ナリ先生診之曰是小柴胡ノ症ニ非ス
此人平生ハ腹ハ背ニツイテアラニ然
ルニ今心下硬滿スルハ是水ノサハケ
スミテ心下ニアル之故ニ故ニ發ニ發ニ伏
ノ旦痞硬ニホタサレ解セ又之具止足
部ニ腫氣アリ尋竟明ノ強ナ人ナル故

ケ様ノ症今予カ治方ハ利ニ解焚ヲ兼
テ与ル之必小柴胡ノ場処ニ非ス只病
客ヲ察スルヲ却ニ非ス病在腹診何モ
綿蜜ニミテ具撰標ヲ辨スル一之他ニ
非スト犀角湯ノ方ヲ与テ一兩劑ニ
テクツト四下痢ヲ小便殊ノ外快利ニ
夜中ノ焚ヤミ煩向ヲ減ミ之兎角病后
ハ食養生第一之故ニ右ノ劑ヲ与テ麦
飯ノミヲ食用ニサセラル後寬中湯加
薯蓣炙麥蘖犀角方ヲ与ラル取人此
脈ヲ向先生曰脈人惡ニカラ人不得不
沉中ノ脈ニ指別數ニニ無之ヲタマカ
リシト云フ
又曰犀角湯ハ暹羅細月ノ方ニミテ殊
ノ外面白方之犀角茵陳山色子ニテ伏
漿ヲ解ミ下小水ニ導キ生芩水方ノ動

鎮ノ伏苓生苓水導ヲ通ガ第ハ心下ノ
凝ルヲケミ耳中ニテユルメル等ノ功
アリ是面白カナリ
先生曰先症病ニ大熱煩渴譫語等ノ症
何モ發ハ燒ケ付振ノ氣吐渴ハ燒ケ石
ノ様ナル氣味病体ニテハ諸選ノ按皆
白虎湯ノ附方ナラニ又品ニ因リ兼
氣ノ之ヲ所也ト云人モアラニ是皆當
實ノ理ナラニ碰ミナカラ如此症ニ存
ノ外成ル莫附湯之ク処アラニ又犀角
生節ニテ動氣ヲ活メ胸下ヲ緩メ之ク
ノ症アラニ大抵病大ヲ療スルニ如是
者ニテサミノ模様ニ有ルナル故ニ
余カ作瘰ハ殊ノ外脉症腹診ヲ綿蜜ニ
テ而ミテ治スルナリ

一男子氣血十二皮肉豐滿昨与六月日
リ數嗽アリ酒客ニテハ非レ氏又一向
酒飲ヌ人ニモ非ス極近來禁酒ニ居ル
由之歩スレハ息クル三三エツナ三先
生訪之曰予カ疝瘕ニテ旦禁畢ヲ不悞
ハ又大病ニ成ヘケレ共能ク悞ル有ハ
必本復サセテアルヘシト附方沈香散
氣合點疼湯方ヲ与ヘラル且飲食ハ糲
米ナシニ麥ノ糜粥ヲ中碗ニ一碗宛日
ニ六度ニ食シメ菜料ハ大根ノヲ口ニ
ニ酢ヲカケ或ハ昆布ヲ以テ此余一切
味噌醬油ヲ堅ク禁スヘシ又塩モ同ク
禁スヘシ且此病人時々羊子ノ色ノ如
キ者ヲ吐ス又其内痔茹ノ皮ノ様ナル
者ヲ吐スル敢テ血ニモ非スト先生家

柳疔散加芍藥

先生曰去冬ノ疫ハ升陽散火湯ノ之ク
処多シ今年ノ疫ハ柴葛解肌湯ノ之ク
処多シ兎角今年此疫ハ石劑ノ之症ニ
疫ニ謔語等アル症ニ咽喉腫テ第水通
セズ依テ既風解毒加石膏方ヲ与ヘテ
服方前ニ書スル通也然レテ咽喉ノ腫
作ミテ後ニ柴胡合白朮方与ルノ有
十二歳ハカリナル少頃ヲ診メ曰此症
ハ不聞スルト病方ノ如ニ成者ニ當時
虫トナシテ治スル也家方洋府湯加麥
蘗大方ヲ与ヘラル

先生曰丹麥大寒湯ノ分量ハ各丈ニメ
等分ナシ

先生曰凡ソ積氣アル人積氣ノツヽ張

表へ能見へ腹上ニ午ヲ按ラ突突タル
時ハ是レ病客ノヒキイラテ大ニ衝キ
擾動スル時之又其積氣ノ脊背ニツイ
テ腹上ニ見ハ難キ様ニナル時ハ是病
客懶惰ナリ出遊モセス事ノ外急惜ノ
負ヲ見ス之故ニ積氣アルノ症病客ニ
及ニテ養生ヲ進ムヘシ及ストハ積氣
脊背ニツイタル懶惰ノ時ハ頻リニ遊
行遊樂ヲ進メ積氣ノ腹上ニ突突トシ
テ事用ニ動搖スル時ハ是ニ氣ヲ緩メ
ル様ニ戒ヲ施スヘシ務テ右等ハ心
得ヲ教取スヘキ者ナリ

一土疸瘰癧ニテ咽喉腐爛耳モサシ瘰
癧言詔モ方リ兼音声モ鼻ニ拂ル症也
荻野左衛門診之氣ヲ勞セニナリ来ル

夏之ト先生訪之曰吾門ニハ譬ハ昔時
下痢便毒ヲ病又表ハ何ノ瘡一ツ発セ
又人ニテモ微毒アル人ハ有ト云ル如
何ナル貴人高閣ニアル人ニテモ右ノ
如シ是是ク診察ノ模標アルト天候ノ
色ノ診腹部ノ此症ハ微毒ナリ是屹ト
診ユレナリ
ニタル見當アリト病人某ヲ凡フ因テ
覽中湯加吉更連壳薯蓣芍药方ヲ与ヘ
旦珠珍花三十粒アテニ朝飯ノ後空心
ニ一度夜中偈即テ一度都合六十粒也
梅ニ三十粒ノ目
大瘡六分五厘ニ先生曰此症格別ノ瘡
元無故ニ瘡出スル也僅ニ強人ニテ
無故ニ又強キ削モ与ヘラレ又故ニ作
リヤウモ六ツカニキト
先生曰生節ハ水分之動タカフル者ニ

決メ之ク処之

時疫面赤下利吐逆ノ症ニ附子粳米湯
子ヘラルヲ有リ

先生曰凡疫ニ面ノ赤ハ六ツカニ分陽
散火湯犀角湯ノ症ニアリ然ニ其陽ヲ
与ラニ日月當ニ赤色退ケハヨシ不通
ハ危命難治ナリ

先生曰吾色ハ假令ハ黒胎ニモ白虎湯
ハ尤ナレ氏真武ノ之ク症アリ白胎灰
色杯段ニアレ氏大概右ノ如ク成者故
ニ吾色ニテ投劑スルヲハ疎也只ニ白
虎湯ノ黒色真武ノ黒色トテ見ルヲ是
等尤察スヘクナレ氏畢竟吾ノ診ニハ
胎ノ有処ニテ診察スルヲ是レ吾診ノ
秘授之故ニ吾色ヲ以テ差別ヲ立ルヲ

ハ見識ナキ一也是吾人ノ診舌ノ法專
ラ指ト色トノ付処ニ因テ辨別スルユ
ヘニナリ

先生曰予往歲近ハ妙薬ヲ用ル一處汚
成ラテハ之カヌ物ト心得ミテ誤リ之
疫ニモ是ヲ用ル所アリ是予カ誠識ミ
テ是面白ナリ其症ト云ハ疫ニミク
シ行カ出ラモ此藥カ解セス指別附劑
ヲ与ル症ニテモナリ兎角ニ一ケニキ
牛蒡キ処アリケ様ノ症ニ用テ耶ヲユ
ザハナス也散火湯杯ノ之ク症ノアニ
ハイ故ニ升陽散火湯ヲ小劑ニミテ燥
毒生テラ大主劑ニミテ用ル症アリ是
等ノアニバイニテ妙薬ヲ用ルニ是白
白キ処アリ又何藥カ著スル書ニ症ニ

不換金正氣散ニ煖姜ヲ主ニ加テ佐シ
案アリ是モ見識ナリ予カ小半夏加テ
查陽ヲ以テ疫ヲ佐スルモ是ナリ傷
寒論方ヲ以テ疫ヲ佐セニト急ク傷寒
法ヲ云者無識ノ野巫選之夫疫ト云者
勞初ヨリ勞胡陽ノ場名ノ症ヲ見ス者
ニテ本ヨリ正傷寒ノ如圭支テ黃陽ヲ
以テ之ク症トハ別也是疫ハ傷寒ト寂初
ノ機リトノ違ユヘニ之具裏症ニ至テ
ハ傷寒ノ法方異ルヲナシ
何人升陽散火陽ト犀角湯ノ之ク具差
別ヲ聞ニトヲ希フ先生答曰散火湯ハ
又違フ処アリ犀角湯ノ症ハ熱モ三ツ
クリトアリ小使スルモアリ不利スル
モアリ譫語スルモ有リ無モアリ尋竟

愚將ニ僻見カハ知子氏犀角湯ハ本莫
附陽ノ方ヨリ變メ廻出ニタルト存之
初考為第ト廻タル処妙ニハ先生曰初考
為第ヲ加ルハ山肥子竹茹犀角ニテ心
不及処ナリト同功アリケ様ノ処之ヲ犀
角湯ノ方意ケ様ニ考ル假令本人ノ方
意ニ背ク氏本人ノ考ニハ忠臣ト可云
人左様ニ考レハ拾別ニ治方ノ見識ヲ
開クノ之故ニ曰能ク察スルノ肝要ニ
此間モ一医疾ヲ治ス先生ヲメ誇樂ヲ
乞故ニ先生行ラ之ヲ誇ス前送曰既ニ
是迄白虎湯ヲ以之ヲ三カト不活舌モ
黒シ今日ニテハ大概氣陽ノ可場成
ト云先生聞之曰吾等ラス吾人里ク氏
此症ハ氣陽ノ之ク症ニテ人尤ナシ

白虎ノ行ク症ニテモナニ此舌色モ白
虎ヲ与ニ故里胎ニ成タルト存之如何
トナレハ何分ニモ此病人ニ左様ノ劑
以テ之ク腹ナニ故予カ見如是前医聞
之嘆テ先生ニ匠ヲ乞フ因テ犀角湯ノ
症ニニ故犀角湯ヲ与ル夫ヨリ快氣セ
ニト先々是等ノ処考ヘニ

痘后先生家ヘ寄シテ診察ヲ凡ニ来ル
病人ニ取初ヨリ先生ノ匠療ニテ

本腰ニテモタルニ

達原

飲加石羔方ヲ与ヘウルアリ

痘ニ汗陽散火陽ニ生節犀角ヲ加ル方
ヲヘラ尿モ通ミタルトニテ前方ニ加
生市斯方ヲ与ルアリ

痘ニ紫葛解肌ヲ与ヘテ后ニ紫白合方
ヲ与ヘ讒言止ニ快キ方ニ向テ紫ニ尿

亦通ムチヤトニテアリ先生曰追付
原ニ可通ト大柴胡加中の方与ルアリ
先生曰毒氣ノ舌ハワレタル処ムチヤ
クチヤトキタナクワレルハ毒氣ノ舌
チヨツト様ニ又奇麗ニラ舌ノワレタ
カケタル様ニ又奇麗ニラ舌ノワレタ
ルアリ是人肝ヨリノ毒チリ是違ト
勿レト毒氣ノ舌ワレルハ毒ノ舌ノ
チチ思ニラ詩スルト存ルハ秘メ見ル
故子細ニ分明ニ聞カヌナリ
門人虫断ニテ痛ム者ノ方方何ノ先
生答曰三黄湯加羌活方方取ハ凉隔散
去芒硝加石羔方方与ヘテ可也
門人診人曰荻野方衛門ノ症ヲ治スル
之温疫論ノ邪募源ニツクト云テ以テ
治スル故最初ニ汗ヲ発ルヲ不致行ノ
出ルヲ厭テ初ヨリ三黄湯或大柴胡原

九味清將等湯ヲ以テ之クト旦ツ石莖
ヲ用ルモ最初ハ不用之有行有陽ノ石
莖ノ症備ワラ子ハ使ワスト云先生是
ヲ聞テ曰夫レ瘕ヲ治スルヤ予治方
ヲ瘕ヲサセテ治スルヲ有リ尤瘕ノ行
ヲ瘕ルヤ桂支戸黃ヲ以テハ内ヲ瘕
ルヲキ又之此間モ一家モ瘕病人アリ具
家庸送ノ行ノ出ルヲ忌ト云テ聞テ事
ノ外行ノ出ルヲ忌ル庸送モ又行ヲ止
トミテ益氣湯ニ人參ヲ加ヘテ行ヲ止
メニトス時ニ先生ヲ招テ診テ之ヲ先
生診メ曰此病人ハ予カ治法マ大ニ瘕
ヲサセテ治セニト思フ何ソ行ノ出ヲ
恐ニヤ病家聞之テ嘆メ先生ニ治瘕ヲ
乞ニ因テ先生紫菀解肌湯ヲ与ル一

日具夜大ニ発汗ニテ頓ニ焚解メ快ニ
因テ又前方ヲ改メテ達原飲加石羔ノ
方ヲテラ次第ニ快クナル後ニ大柴胡
加耳中ニ轉セラル之夫レ何ソ最初ニ
汗ノ有ヲ厭ニヤ又発汗ノ制ヲ与ル
ヲ厭ニヤ但ニ圭支戸黄ニテハ疫ハ何
分ニモ発汗セ又之是人意味アル
故ニ柴葛解肌ヲ以テ大ニ発汗スル之
又其上ニテ達原飲加石膏ヲ与ル
意味アル
之柴葛解肌ニテ解肌ハ発
汗ヨリノ肌表ニ解スルナレト腸胃ニ
疫毒ノ残ル者ハ必ス五三日過テモ後
発スル之此症ニ人達原飲加石膏方ヲ
与ルカ宜キ之門人皆尤様ニ心得ヘキ
也右ノ柴葛ノ后ニ達原飲加石膏ノ方

与ルニ此急味ナリ旦又款野ノ石差ヲ
使フニ楊玄誦ノ石劑ヲヤル処ノ症ヲ
備テ使フニ投キ使ヒ様ナル石差也余
力用ルハ大ニ是ニ異ナリ
周身微毒ノ病人ニ抑肝散ヲ与ハラル
ト有リ積氣ノ短キ人成故肝ニテ周身
ノ微毒モ十分ニ発セ又故抑肝ニテ却
テ微毒ヲ表ヘ逐ト見ヘタリ誠ニ是等
ノ処諸病ニアルヘキト
茶主乃丹合方ヲ服スレハ胸息苦ニク
脚氣ノ氣味アリ因テ換蘇散加夜苓方
与ルヲアリ
痰ニ茶葛解肌ヲ与ヘテ後ニ茶白合方
ニ轉ニ又大茶餅加丹中方ニ轉ニ又竹
茹溫膽湯加吳萸方ニスルト有リ此生

曰痼后疼痛アル者茹温加味ニテ可ニ
先生曰婦人ヲ訪ミ疝症ノ病者アリ段
々疝症ノ容子ヲ述ラル、一毎々ノ如
唯東垣ノ所謂脾虛疝水ニ象スト云症
ナリ故ニ下劑ニヤラレス也ト云テ茶
圭芍耳合方ヲタヘラルアリ
先生曰人參心下痞鞭ヲ治スル潤燥生
津ノ劑也諸君人參ヲ苦クミテ心下ノ
痞ヲ治スルト云竹節參直根參ヲ以テ
使用ス是僻ナリ耳ニテ心下ノ痞鞭ヲ
緩ルヲ不知也予カ母毎々心下痞鞭
スルニ導ニ廣東參ヲチメ服メ須臾ニ
宜キテ唐ノ見ミ之旦日本ノ參ハ苦ナ
シ氏本草ニモ云如ク參ハ唐ヨリニ朝
鮮ノ産力最上ニテ極上ノ參ハ味耳ト

云テアルニ當時人參ハ不用ニテ宣ト
云人モ有レ氏右ノ心下痞鞭津燥虚メ
心下ノ痞硬スルハ是那ニ無^參ニ無^二ハ
竅ニ又^レ耳中ニテモイカヌ^一

又麦門冬ハ生津潤燥ノ功アリ參ノ之
処ノ午前ノ症ニ用ヘキ様ニ似タリ

產后虚症ノ血暈ナト附子割ハヤラ^レ又
是等ハ是那ニ廣東參ヲ可用ナリ

一老婦遺方之家事ニツケ事之外勞役
入奥後咳嗽不食面色平生ノ如ナリ先
勞症ノ如キ者难治之ト附方麦門冬湯
耳中ノ大寒去テ加煖姜薯芋方子ル^一
一男子下血續キ大便不通小便^{アリ}不通
腹滿ニテ欲死匿者曲物湯加厄子黃柏
方ヲ与フ腹滿ニテ欲死故ニ病人氣張

ヲ小便セニトスル処忽テ陰中ヨリ亮
粒ノ如キ物ニツ突出ス其後小便ニ右
許ヲ通メ腹滿サカ快ニ先生ニ訪フ乞
第ヲ乞フ内テ猪苓湯加將軍方ヲ与テ
小便段ニニ通セト先生曰陰中ヨリ
出シ物雞冠雄黃ノ如ク成色ニテ堅ニ
大抵雄黃ノ如成物ニト又曰猪苓湯加
將軍方是レハ正散ノ心持ナリ

何人生節ト于節ノ之ヲ別ヲ問先生曰
生節ト于節トノ如シ指別ノノナシ只
動氣ヲ収メテ輕ク之クニハ生節宜ニ
根強ク之クニハ于節カヨキニ
痰ニ升陽散火ニ加生節犀角方ヲ与テ
後ニ紫胡姜炒圭加茯苓方ニ轉ル又后
ニ犀角湯ニスルナリ

一小兒不言不語耳聾廢人ノ如シ先生
ニ詣テ乞フ先生曰一二年モ腹メ可見
全ク狀全サセテトハ云ワレ又之抑肝
散加芍藥ヲ与ヘテ隔日ノ夜紫田ヲ与
ノ數与ヘラルル旦先生亦メ曰紫田ヲ咬
咀セスメ可腹咬咀ノハキメ力薄ニト
黃胖病ニテ凡ノヘケル症ニ香砂天君
子加麥芽大方ヲ与ラル

先生曰初生小兒便秘不通大黃芒硝不
能下者切ニ勿攻下若攻下百端而不下
ハ治之方後世ノ四物湯与レハ硬通ス
ルニ

先生曰胃ノ氣薄キ瘧ニ截劑ヲ種々ニ
行テ截サル者ニハ人參養胃湯加減方
ニテ治スル之其効多シ廣東人參ニテ

王口シ

虚勞ノ症ニ直達散藜蘗合方ヲ与フル
一有り

小羊豆加夜苓湯ニ橘皮ヲ加ヘタル方
呔ヲ止ルニ妙也動氣アル者ハ薯蓣ヲ
加ル又呔逆アル者ハ丁香ヲ加ヘテ
之ク之

脚氣ノ呔吐ハ小羊豆加夜苓湯ニテハ
治ラス之家法藟胸湯ニテ之ケハ治ル
ナリ

先生曰耳中粉蜜湯ハ本方是千金方ニ
ハ方名ナシ後人キリスイテ金匱ノ中
ニ入ル粉ハ粳米粉之腹部處ニハレ起
ル者ニ用テ効アリ

舌益赤ク薄成ハ虚火上升ナリ

肺痿ハ肺癰ノ如ク臭ヲ吐ク者ハ臭
ノ肺痿肺癰ニ非ス腐火止冬ニテ心
ノ莖ス故ニ左脈ノ症ヲ見ス之

先生曰初ヨリウテツケタル定方ノ無
キ症ハ六ケ三ク必死ノ症氏可云ナリ
先生曰治瘵ニ先手後手アリ若前後ス
ルト吳詒察スル処ニ當共吳効ナキ之
此間一病人アリ足心湧泉ノ辺ヨリ足
ノ股ノ付根ニテ日夜數十度火ノ往來
スル如ニサテ時ニ發熱ニ吳起ル時ハ
病人唯塊程ノ他送見之脚氣ナリト云
テ余自皮吳葉史ノ類ヲ以テ之クト云
凡吳効ナシ先生ヲ乞テ令詒先生見之
ニ腹部脘ノ右ノ方脈ヨリサシ正方
リ小腹ニテ累々トシテ午ニ應スル者

有病人ニ大便ノ通ルヤ否マヲ問曰ク
數日不大便ト先生此症ハ脚氣ト云ハ
ル矣リ去共此大便ヲ又クニ非ニハ具
實ニ解セメ之旦今大便燥屎ト成テ胃
中ヲ離テ大腸廣暢ノ間ニ累々タリ調
胃養氣ヲ作テ二三割ト成ト燥屎通メ
諸症愈エリ此上ハ脚氣ノ治療ニテヨ
キナリ是所謂先手後手ヲ審メノ法也
子ハ無効探ク可考ト之能ク可心得
右ノ病人老人ニ瘵元氣弱質ニ非
ス下割ヲ与ル模様有リシ故ニ之
若此病人今カシ日ヲ経テ下割ヲ与
ルニ堪難キ時ハ大ケシキ処アリ先
潤涼ノ劑ニテ之クハモナリ

先生曰腹診ハ手ヲ平ニシ可診不瘵ハ

病人三エツナガルナリ先鳩尾ヲ診ニ
次ニ水分夫ヨリ次第ニ任脉通りテ脉
下ニテ診ニ任脉ノ變ヲ見旦又動有者
ハ任脉ノ本經ニ動アリ又左右ノ動氣
有テ異ニ、キ任脉ニ及ニタル動アル
又任脉ノ動ニメ或ハ左リ或ハ右ハ具
ニ、キノ志スルアリ故ニ是等ノ処ヲ
綿蠻ニ分タサレハ附方ノ処大キニ相
遠アリ故ニ最初ニ鳩尾水分夫ヨリ任
ノ通り横下ニテ診フツキニ任脉ヲヒ
ラキ左右ヲ上ヨリ下ニテ診スソレヨ
リ左右ノ積氣ノ胸脅へ入ル入ラサル
ヲ診フ夫ヨリ左右肋脅章門ヲ診フ是
大法ナリ

陽明人
旁一
厚尾

水方。

章門

右大抵圖ニモ舉ル処ノ如シ何レモ手
ヲ平タニシテ診スヘシ又腹診ニ掛ル
初二手ヲ輕ニニメ腹上ノ皮膚ヲナテ
可診似実ノ虚アリ旦又肥満スル人ノ
虚ハ見ニクニ能ク可診又虚里ノ動
ハ尤モ腹診終テ後ニ可診並ニ胸膈上
ノ皮膚モ診スヘモ
抑肝散加芍薬ノ病客ニ足部ニ灸石致
サレ三里止廉_下廉ナリ連日一穴ニ二
十壯當ニスヘシト先生重テ曰此後背
ニ又段々灸スル之ト
先^半一男子ニ脚氣ノ灸石ヲ致サレ三里

三陰交絶腎上下廉フデ以上六ヶ処之
又俗間ニフ^ッデト云^ハウ灸入此五法セ
ラルヲ見ル方ニ記ス

人ヲメ定テ並ヘテテテ衣ヲ解ヒテ

丙午ヲ壅レヲ口三股ノ表土ニ壙テ中

指ノ尽ル処ニ至ス
或曰凡地ハ奇氣

別名

又一病客灸巨ヲ致サルトアリ左圖ス

○三
○四
○五
○六
○七
○
季門

00000

推○
推○
推○
推○
推○
○
韋○

右坑五處合ノ三五十五坑也皆滑ヲ開

兩行校キナリ

又一方ノ五方ニ記ス

[illegible]

MS B 677

○ ○ ○ ○ ○

推 ○ ○ ○ ○ ○

○ 韋門

右穴処合メ三五十五穴也脊骨ノ枝ム
ノ間キハ、ハ脊骨ヲサシ間キ誰人モ
肉ノ高ク成テアル者ニ此処ニ点ヲス
ル也三推ヨリ七推迄ノ灸法九推ヨリ
十三推ノ灸法共ニ皆韋門ノ穴ヲ漆テ
灸点サセラルル之上ノ五ヶ処ト下ノ五
ヶ処ト連フ迄ナリ其余人皆同シ



